Siete días de tratamiento antibiótico para bacteriemias por Enterobacteriales en pacientes neutropénicos: Hacia un nuevo paradigma

Herrera F¹, Torres, D¹; Laborde, A²; Jordan, R³; Tula, L⁴; Mañez, N⁵; Pereyra, ML⁶; Suchowiercha, N⁷; Berruezo, L⁸; Gudiol C⁹; González Ibáñez, ML², Eusebio, M³; Lambert, S⁴; Barcán, L⁵; Roccia Rossi I⁷; Nicola, F¹; Pennini, M¹⁰; Monge, R³; Blanco, M⁴; Visús, M⁵; Vilches, V⁶; Reynaldi, M⁷; Carbone, R⁸; Pasterán, F¹¹; Corso, A¹¹; Rapoport, M¹¹; Carena, A¹

CEMIC, 2. FUNDALEU, 3. Hospital Británico de Buenos Aires, 4. Hospital El Cruce, 5. Hospital Italiano de Buenos Aires, 6. Hospital Universitario Austral, 7. HIGA San Martín, 8. HIGA Rodolfo Rossi, 9. Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona 10. CEI Dr. Stamboulian, 11. Servicio de Antimicrobianos, INEI-ANLIS Dr. Carlos Malbrán.

Introducción

- Tratamientos cortos vs. prolongados en neutropénicos: resultados semejantes.
- Unicéntricos: 2 retrospectivos^{1,2} y 1 prospectivo³.
- Muestra pequeña, población no homogénea y no estratificación exacta de días de ATB.

¹Metais A. *J Infect.* 2022 Jan;84(1):1-7.

²Ranganath N. *Transpl Infect Dis.* 2023 Jun 6:e14085.

³Herrera F. *Microorganisms* 2023, 11, 511. <https://doi.org/10.3390/microorganisms11020511>

Objetivos

Pacientes neutropénicos de alto riesgo con bacteriemia por Enterobacterales y tratamiento antibiótico por 7 vs 14 días:

- ✓ Recurrencia de la bacteriemia.
- ✓ Mortalidad a 30 días.
- ✓ Duración de la hospitalización desde la bacteriemia.

Materiales y métodos

- ✓ Estudio de cohorte longitudinal, prospectivo y multicéntrico (2014-2023).
- ✓ **Adultos con neoplasias hematológicas y TCPH, NAR x score MASCC.**
- ✓ **Bacteriemias monomicrobianas por Enterobacterales y seguimiento a 30 días.**
 - **Sin focos que requieran tratamiento prolongado.**
 - **Sin focos que requieran cirugías.**
 - **Remoción inmediata de CVC.**
 - **Tratamiento antibiótico empírico apropiado.**
 - **Resolución clínica y afebril por 96 h.**
 - **Supervivencia al menos 48 h. luego de finalizado el tratamiento.**
- ✓ **Tratamiento antibiótico: 7 días vs. 14 días.**
- ✓ Test de chi-cuadrado o exacto de Fischer, U Mann-Whitney.

Resultados

Pacientes evaluados con bacteriemia por Enterobacterales: **1037**

Pacientes excluidos por no cumplir con los criterios de elegibilidad: **837**

Pacientes incluidos: **200**

7 días: **100**

14 días: **100**

Características de la población y tratamiento

Variable	7 días (n=100)	14 días (n=100)	p
Edad en años (mediana, RIC)	48 (32-61)	51 (35-64)	0,48
Duración de NTP (mediana, RIC)	15 (10-23)	13 (8-26)	0,19
Leucemia aguda	65%	70%	0,43
Foco clínico	54%	57%	0,66
Bacteriemia complicada	35%	41%	0,38
Score APACHE II	16 (12-20)	15 (12-18)	0,14
Score Pitt	1 (0-2)	0 (0-2)	0,12
Tratamiento empírico combinado	40%	47%	0,31
Tratamiento definitivo monoterapia	99%	92%	0,03
Fin de tratamiento con neutropenia	46%	26%	0,003

Etiología

Perfil de resistencia

BGN multirresistentes

Recurrencia, mortalidad y duración de la internación

Variable	7 días (n=100)	14 días (n=100)	<i>p</i>
Recurrencia	7%	2%	<i>0,17</i>
Mortalidad a 30 días	3%	1%	<i>0,62</i>
Duración de internación desde la bacteriemia (mediana, RIC)	9 días (7-14)	14 días (13-22)	<i><0,001</i>

Conclusiones

Tratamiento antibiótico por 7 días en pacientes neutropénicos de alto riesgo con bacteriemia por Enterobacterales y:

- Tratamiento empírico apropiado.
 - Resolución clínica.
 - Control de foco.
- ✓ Puede ser adecuado y reduce la duración de la internación.

¡Muchas gracias!

<http://registorocas.com.ar/es/home/>

CONGRESO DE INFECTOLOGÍA 2023
XXI CONGRESO API - XXIII CONGRESO SADI
13 al 15 de septiembre - Hotel Hilton, Buenos Aires, Argentina